



# Luna Experience 400 SC

Fungicida / Suspensión concentrada

## DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:**

FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLE

**Composición porcentual:**

Ingredientes activos:	% en peso
Fluopyram: <i>N</i> -{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridil]etil}- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro- <i>o</i> -toluamida .....	17.70
(Equivalente a 200 g de i.a./L a 20°C)	
Tebuconazole: ( <i>RS</i> )-1- <i>p</i> -clorofenil-4,4-dimetil-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol .....	17.70
(Equivalente a 200 g de i.a./L a 20°C)	
<b>Ingredientes inertes:</b>	
Espesante, dispersante, antiespumante, conservador, anticongelante, emulsificante y solvente .....	64.60
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

**Categoría toxicológica:**

Precaución (V)

**No. de Registro:**

RSCO-MEZC-FUNG-1365-0442-064-35.40

**Sistemicidad:**

Sistémico	Contacto	Translaminar
X		

**Descripción:**

Nuevo fungicida sistémico con propiedades preventivas y curativas para el control eficaz de la Cenicilla polvorienta en cucurbitáceas, prolongando la vida productiva de los cultivos así como la de los frutos en anaquel.

## USOS

Cultivo	Enfermedades	Dosis L/ha	Técnicas de tratamiento
Calabaza Calabacita Melón Pepino Sandía (7)	Cenicilla <i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.5-0.7 L/ha	Iniciar aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad, repetir en caso necesario a intervalos de 7 días, realizar un máximo de 4 aplicaciones.

El tiempo de reentrada a las áreas tratadas es de 12 horas.

( ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

## PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 L