



## Productos Fitosanitarios

# Adengo®

Herbicida / Suspensión concentrada

### DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:**

ISOXAFLUTOLE + THIENCARBAZONE METIL

**Composición porcentual:**

Ingredientes activos:	% en peso
<b>Isoxaflutole:</b> (5-Ciclopropil-1,2-oxazol-4-il)( $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-2-metil-p-tolil)metanona:.....	19.00
(Equivalente a 225 g de i.a./L a 20°C)	
<b>Thiencarbazone Metil:</b> Metil 4-[(4,5-dihidro-3-metoxi-4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il)carboxamidosulfonil]-5-metiltiofeno-3-carboxilato .....	7.60
(Equivalente a 90 g de i.a./L a 20°C)	
<b>Ingredientes inertes:</b>	
Protector de cultivo, anticongelante, dispersante, humectante, espesante, antiespumante, conservador y disolvente:.....	73.40
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

**Categoría toxicológica:**

5 Precaución

**No. de Registro:**

RSCO-MEZC-1261-301-064-027

**Sistemicidad:**

Sistémico	Contacto	Translaminar
X		

**Descripción:**

Herbicida pre emergente selectivo para maíz que se emplea en el control de malezas gramíneas y hojas anchas.

### USOS

Cultivo	Malezas		Dosis mL/ha	Momento de aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
Maíz (SL)	Hierba del pastor Fresadilla Quelite Zacate triguillo Zacate pata de gallina	<i>Acalypha indica</i> <i>Aldama dentata</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Brachiaria plantaginea</i> <i>Eleusine indica</i>	300 (suelos arcillosos)	Aplicar en preemergencia a la maleza y al cultivo. Se recomienda que el suelo tenga suficiente humedad para una mayor actividad del producto.
	Gigantón	<i>Tithonia tubiformis</i>	300 (suelos arcillosos)	Agregar un kg de Atrazina polvo humectable al 90%

Adengo®

Página 1 de 2

## Productos Fitosanitarios

Hierba del pastor Quelite de puerco Verdolaga Chayotillo Mala mujer Gigantón Zacate triguillo Zacate cola de zorra	<i>Acalypha indica</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Sicyos deppei</i> <i>Solanum rostratum</i> <i>Tithonia tubiformis</i> <i>Brachiaria plantaginea</i> <i>Setaria adhaerens</i>	200 – 250 (Suelos arenosos)	Aplicar en preemergencia a la maleza y al cultivo. Se recomienda que el suelo tenga suficiente humedad para una mayor actividad del producto.
Achualillo Gigantón Hierba del pastor Zacate pata de ganso Zacate triguillo	<i>Simsia amplexicaulis</i> <i>Tithonia tubiformis</i> <i>Acalypha mexicana</i> <i>Eleusine multiflora</i> <i>Brachiaria plantaginea</i>	200 – 250 (Suelos arenosos)	Realizar la aplicación en forma preemergente al cultivo y a la maleza.
Campanita Quelite Zacate cola de zorra Gusanillo	<i>Ipomoea purpurea</i> <i>Acalypha setosa</i> <i>Amaranthus hibridus</i> <i>Setaria adhaerens</i>	300 (Suelos arcillosos)	Realizar la aplicación en forma preemergente al cultivo y a la maleza.

(I.S.) = Intervalo de seguridad: días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha. SL= Sin Límite  
El tiempo de reentrada a las zonas tratadas es de 24 horas después de su aplicación.

### RESTRICCIONES DE ROTACIÓN

Cultivo	Días entre aplicación y siembra del cultivo
Brócoli	30 días
Cebada	120 días
Cebolla	180 días
Chile	30 días
Garbanzo	30 días
Jitomate	30 días
Maíz	30 días
Papa	30 días
Tomate de cáscara	180 días
Sorgo	180 días
Trigo	120 días

### PRESENTACIONES DISPONIBLES

250 mL y 300 mL